## A V E R T I S S E M E N T S A G R I C O L E S

DLP-4-6-80583331

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE -

ÉDITION DE LA STATION "LANGUEDOC-ROUSSILLON"

AUDE GARD - HERAULT - LOZERE - PYRENEES ORIENTALES)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

MAISON DE L'AGRICULTURE - BAT. 5 - PLACE CHAPTAL 1076 MON FELLIER CEDEX - TEL. 92.41.42 ABONNEMENT ANNUEL

Régisseur de recettes de la D.D.A.

C.C.P. Montpellier 5238-57

30 Mai 1980

BULLETIN N° 8 destiné aux agriculteurs du Lauragais

POIS:

La pluviométrie de mai (22 jours soit le double d'une année normale) a favorisé le développement de <u>l'ANTHRACNOSE</u> et du <u>BOTRYTIS</u> dans toutes les situations.

Sur les cultures en fleurs, un traitement au benlate est recommandé dès que possible, afin de protéger les jeunes gousses. Il est actif contre les deux maladies, à la dose de 0,500 kilogramme de produit commercial à l'hectare. L'application doit être faite sous forte pression afin d'assurer une bonne pénétration de la bouillie dans la végétation.

Tout retard nuit à l'efficacité du traitement.

: CEREALES:

Malgré le temps défavorable, les céréales restent saines. La Rouille jaune est remarquée à un niveau très faible dans deux champs ; elle évolue peu.

- La Rouille brune reste limitée.
- Les pucerons sont très rares sur épis.
- Seuls quelques champs de la variété Roazon, atteints d'un <u>Oïdium</u> important sur les feuilles supérieures, nécessiteraient un traitement préservant <u>l'épi</u> de cette infestation.

Recherchez attentivement la Rouille jaune et signalez sa présence éventuelle à LOUDES

Pour le Chef de Circonscription l'Ingénieur en Chef d'Agronomie Adjoint,

G. THEISSEN

78